



## الرياضيات وفن الغرافيك

لطالما ارتبطت العلوم بالرياضيات، فالرياضيات تعد عموداً وأساساً مهماً للعلوم الأخرى بحيث تضمن لها الدقة اللامتناهية، لكن تطبيقات الرياضيات تتعدى العلوم إلى مجالات أخرى، سنختار لكم اليوم التحدث عن علاقة فن الغرافيك بالرياضيات.




[[image1](#)]

لا شك أنكم سألتهم عن مدى أهمية دراسة فرع الهندسة متعددة الأبعاد  $Geometry\ in\ \mathbb{R}^n$  وعن وظيفة

المتجهات  $\overline{vect}$  والمصفوفات  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$  والمُميّزات  $det(vect1, vect2, \dots)$  وغيرها من المصطلحات الرياضية، ببساطة، لو لم توجد هذه المفردات الدقيقة لما استطعنا استعمال فن الغرافيك لخلق صور وتصاميم وأشكال مميزة، سواء أكانت ثنائية أم ثلاثية الأبعاد.


فمثلاً، يمكن اعتبار أسطوانة عبارة عن اتحاد لقرصين علوي وسفلي وجسم الأسطوانة بالوسط، كل يتم التعبير عنه بمعادلة رياضية:



$\{(x, y, z), y = -\frac{h}{2}, x^2 + z^2 \leq r^2\}$  القرص العلوي  
 $\{(x, y, z), y = \frac{h}{2}, x^2 + z^2 \leq r^2\}$  القرص السفلي  
 $\{(x, y, z), -\frac{h}{2} \leq y \leq \frac{h}{2}, x^2 + z^2 = r^2\}$  جسم الأسطوانة

[image2]

تمكنا الرياضيات من كتابة اللوغاريتمات الصحيحة والمفصلة عن الأشكال التي نود ابتكارها باستعمال بعض البرانم، لكن من الضروري دراسة الهندسة المستوية والفضائية لتحقيق ذلك، فعبر معادلات بعض الأشكال كمعادلة الفلكة  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  والدوال كالدوال المثلثية  $x \mapsto \sin(x)$  و  $x \mapsto \cos(x)$  تمكن من التحكم بالتصاميم وكذا إحداث التغييرات والتأثيرات المراد ابتكارها، أما المصفوفات فتمكن من تغيير المعلم المستعمل، فعندما نتحدث عن المعلم المتعامد الممنظم (أي منظم متجهات الأساس لها نفس القياس  $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\|$ ) والمباشر  $(0, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  ليس كالحديث عن معلم متعامد غير ممنظم وغير مباشر بأصل مختلف عن أصل المعلم  $O(0,0,0)$  ، هكذا نتمكن من تغيير إحداثيات متجهة أو نقطة من معلم لآخر دون تغيير موقعها في الفضاء!



### [image3]

كالتاولة ثلاثية الأبعاد الممثلة في الفيديو، فقد تم استعمال برمجة مدروسة على برنامج خاص، وهذا جزء صغير من البرمجة ( وهو يوضح استعمال المصفوفات والمتجهات لتحديد الشكل):

```
#include <math.h>
#define PI 3.1415926535898
// les points de contrôle des trois courbes de Bézier
static float controlPointsH[3][4] = {{ -5, 5, 9.7, 9.5 },
                                     { 0, 0, 0, 0 },
                                     { 0, 4.2, 3.2, 4.5 }};
static float controlPointsB[3][4] = {{ 5, 5, -5, -5 },
                                     { 0, 0, 0, 0 },
                                     { -7.5, -5.5, -9.5, 0 }};


// propriétés lumineuses des sources infinies
static GLfloat ambient_light0[4] = { 0.50, 0.50, 0.50, 1.0 };
static GLfloat diffuse_light0[4] = { 0.7, 0.7, 0.7, 1.0 };
static GLfloat specular_light0[4] = { 0.1, 0.1, 0.1, 1.0 };

static GLfloat ambient_light1[4] = { 0.50, 0.50, 0.50, 1.0 };
static GLfloat diffuse_light1[4] = { 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 };
static GLfloat specular_light1[4] = { 0.1, 0.1, 0.1, 1.0 };

static GLfloat ambient_light2[4] = { 0.50, 0.50, 0.50, 1.0 };
static GLfloat diffuse_light2[4] = { 0.50, 0.50, 0.50, 1.0 };
static GLfloat specular_light2[4] = { 0.1, 0.1, 0.1, 1.0 };

// lumière infinie direction 1-]
GLfloat light_position0[4] = { 1.0, -1.0, 0.0, 0.0 };
// lumière infinie direction -1-]
GLfloat light_position1[4] = { -1.0, -1.0, 0.0, 0.0 };
// lumière infinie direction ]+0.5k
GLfloat light_position2[4] = { 0.0, 1.0, 0.5, 0.0 };

source code: https://perso.limsi.fr/jacquesi/IG-TD/td8-table-modele.c
```



### [movie]

أما أهمية الدوال فتتمثل في أنها تساهم في خلق نماذج هندسية معقدة، بحيث يتم دمج دوال عديدة من خلال استغلال تمثيلها المبياني للحصول على أشكال معقدة، سنعطي مثال الشكل أسفله الذي تم تحديده باستعمال كل من الدوال المثلثية قرص بواكره “*Poincaré disk*” في الإحداثيات القطبية

بالإضافة إلى بعض الدوال المعرفة بمجهولين كالدالة  $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$  وبعض الدوال الشلجمية، إضافة لاستعمال الدوال الأصلية، كل ذلك تتم برمجته على الحاسوب ومن ثم طباعته بالطابعة ثلاثية الأبعاد التي غزت العديد من المجالات الأخرى كالطب والهندسة المعمارية والتكنولوجيا وغيرها.



المراجع: [1] [2]