



السكري يزيد خطر تكون سرطاني الثدي والقولون

كشفت دراسة علمية قُدمت نهاية شتنبير بالكونغرس الأوروبي للسرطان European Cancer Congress (ECC2013)) عن ارتباط الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع احتمال الإصابة بسرطان الثدي والقولون.



الدراسة قام بها باحثون من قسم الجراحة بالمركز الطبي لجامعة Erasmus في روتردام (هولندا)، وشملت تحليل نتائج 20 دراسة تم إجراؤها بين 2007 و 2012 لأكثر من 1.9 مليون مريض مصاب بسرطان الثدي أو القولون، مع أو بدون مرض السكري، حيث وجد بأن المرضى المصابين بالسكري يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهم بـ23% و كذا خطر الموت بـ38% بسبب هذا المرض مقارنة مع المرضى غير المصابين بالسكري، كما بلغت نسبة زيادة خطر سرطان القولون بـ26% لدى مرضى السكري و 30% زيادة خطر الموت منه بالمقارنة مع غير المصابين به.

كذلك وجد الباحثون بأن نسبة كبيرة من مرضى السرطان الذين يعانون من السمنة المفرطة والسكري، يزيد احتمال حدوث مضاعفات لديهم أثناء و بعد العمليات الجراحية، كما أظهرت الدراسة دلائل قوية على علاقة مرض السكري و زيادة احتمال الإصابة بسرطان الثدي والقولون حيث يطمحون إلى توعية المصابين بالسكري والسمنة بارتفاع احتمال الإصابة لديهم حتى يمكن وقاية الأطفال من الإصابة بالسمنة وتطور السرطان لديهم لاحقا عبر تنظيم حملات تحسيسية وقائية.

ويسعى الباحثون مستقبلا إلى تحقيق أعمق في أثر العوامل الأخرى المرتبطة بمرض السكري على خطر الإصابة بالسرطان والموت منه ، كالأدوية المضادة للسكري، الميتفورمين، فضلا عن الأنسولين ومدة مرض السكري.

المصدر: [1](#)